



# Empfohlene IPC-Praktiken bei der Wundversorgung



Bei der Wundversorgung sollten die üblichen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden:

## Durchführung von Handhygiene

- Auch wenn Handschuhe getragen werden, sollte die Wundversorgung davor und danach durchgeführt werden.
- Ach dem Ausziehen der PSA, einschließlich des Wechsels der Handschuhe während des Verfahrens.
- Beim Wechsel von einer schmutzigen Arbeit zu einer sauberen Aufgabe.

## Richtige Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung (PSA)

- Alle Wundversorgungsarbeiten sollten mit Handschuhen durchgeführt werden
- Kittel sollten verwendet werden, wenn die Wundversorgung einen engen Kontakt mit dem Patienten/Bewohner oder seiner unmittelbaren Umgebung erfordert.
- Bei der Wundversorgung, bei der Spritzer oder Aerosole entstehen können, sollten eine Schutzbrille und eine Gesichtsmaske oder ein Gesichtsschild getragen werden.

## Ordnungsgemäße Pflege von Wundversorgungsmaterialien einschließlich Medikamenten.

- Der saubere Pflegewagen und/oder -korb darf niemals in das Zimmer des Patienten oder Bewohners gelangen.
- Das Material im Wagen oder Caddy sollte nur mit sauberen Händen angefasst werden.
- Das Verbrauchsmaterial sollte auf einer sauberen Oberfläche gelagert werden.
- Es muss zwischen sauberen und schmutzigen Materialien unterschieden werden.
  - Wenn es viele Wunden gibt, sollte für jede Wunde ein eigenes Verbandwechsellmaterial vorhanden sein, wobei der Verbandwechsel mit der saubersten Läsion beginnt und mit der schmutzigsten fortschreitet.
- Unbenutztes Material sollte nicht in den Einkaufswagen oder -korb zurückgelegt werden (unabhängig davon, ob es dafür bestimmt ist oder weggeworfen wird).
- Wenn möglich, sollten Sprays oder pharmazeutische Behältnisse (Cremes, Salben) für eine bestimmte Person beschriftet werden.
  - Vor dem Eingriff sollte für jeden Patienten/Bewohner eine geringe Menge des Medikaments beiseitegelegt werden.
  - Der Rest des Behälters mit mehreren Dosen sollte in einem ausgewiesenen, sauberen Bereich aufbewahrt werden.
- Behälter, die in die Pflegebereiche von Patienten/Bewohnern gelangen, sollten für den jeweiligen Patienten/Bewohner gekennzeichnet werden.

## Reinigung und Desinfektion von:

- Wenn Umgebungsflächen und wiederverwendbare Wundversorgungsgeräte nicht ordnungsgemäß gereinigt und desinfiziert werden, können sie Träger von Krankheitserregern werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie wiederverwendbare Wundversorgungsgeräte jedes Mal reinigen und desinfizieren, wenn Sie sie verwenden.
- Alle Flächen im Behandlungsbereich, die während der Wundversorgung kontaminiert worden sein könnten, sollten unmittelbar nach dem Eingriff gereinigt und desinfiziert werden.