

Infektionsprävention in der Wundversorgung



Handhygiene

- **Vor** der ersten Kontaktaufnahme mit dem Kunden oder seinem Umfeld
- **Vor** dem Entfernen des Wundverbandes und dem Anlegen eines neuen Verbandes.
- **Vor** dem Anziehen der Handschuhe
- **Nach** der Gefahr der Exposition von Körperflüssigkeiten
- **Nach** der Interaktion mit dem Kunden oder seinem Umfeld
- **Nach** dem Ausziehen der Handschuhe



PSA

- Tragen Sie während der gesamten Wundversorgung Handschuhe, insbesondere beim Anlegen neuer Verbände.
- Tragen Sie eine Maske und einen Augenschutz, wenn die Gefahr von Spritzern besteht.
- Ziehen Sie bei jedem Verbandwechsel einen neuen Einwegkittel an, um zu vermeiden, dass Sie den Kunden oder sein Bettzeug berühren.



Ausrüstung/ Materialien

- Nach Abschluss der Wundversorgung muss die Wundversorgungs-ausrüstung jedes Kunden entsprechend den Herstellerangaben sterilisiert werden.
- Die Ausrüstung und das Material sollten bis zum nächsten Verbandwechsel entsprechend den Anforderungen der Einrichtung angemessen gelagert werden.



Artikel zur einmaligen Verwendung

- Es ist am besten, Salben und Cremes einem einzigen Kunden zu widmen.
- Es wird empfohlen, bei der Abgabe von Medikamenten in großen Mengen Handschuhe zu tragen und auf gute Handhygiene zu achten, damit keine Mikroorganismen in den Medikamentenbecher gelangen.
- Für eine Wunde sollte ein eigenes Set an Verbandsmaterial verwendet werden, nicht mehrere.



**Durch offene
Wunden können
Bakterien
eindringen und im
ganzen Körper
verbreitet werden.**

Wussten Sie schon?

- Um Kreuzkontaminationen zu vermeiden, sollten Sie saubere und verschmutzte Ausrüstung getrennt aufbewahren.
- Wenn unbenutzte Einwegmaterialien in den Pflegebereich eines Patienten oder Bewohners gebracht werden, sollten sie entweder entsorgt oder speziell für diesen Patienten oder Bewohner aufbewahrt werden.